

# Fungicida

# Enigma®

Fungicida sistêmico de amplo espectro

**Tipo de produto:** Fungicida

**Composição:** Emulsão de óleo em água (EW) com 250 g/L ou 25,56% (p/p) de tebuconazol

**Família química:** Triazol

**Número de AV:** 1659

**Classificação ADR:** 3082, 9, III

**Embalagem:** 40 mL e 1 L



ATENÇÃO

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ENIGMA® é um fungicida sistêmico da família dos triazóis, que atua na demetilação da síntese de esteróis (DMI)
- Tem ação preventiva e curativa, no controle do oídio da videira, doenças do trigo e cevada e olho de pavão do olival
- O produto é rapidamente absorvido pelas plantas, o que o torna resistente à lavagem pela chuva, 2 horas após a sua aplicação

CULTURA	DOENÇA	CONC. (mL/hL)	DOSE (L/ha)	ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (dias)
VINHA	Oídio ( <i>Uncinula necator</i> )	40	0,4	Realizar os tratamentos preventivamente, de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste, iniciar os tratamentos dos cachos visíveis ao fecho do cacho, enquanto se verificarem condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. A persistência biológica do produto é de 12 a 14 dias. Não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha DMI, mais de 3 vezes por campanha.	14
TRIGO	Ferrugem amarela, ferrugem castanha, oídio e septoriose	-	1	As aplicações devem ser feitas após o aparecimento dos primeiros sintomas das doenças, de modo a manter sãs as duas folhas superiores das plantas. Ter em atenção o período que medeia entre o princípio do encanamento e o espigamento, no caso de variedades muito suscetíveis e condições favoráveis ao desenvolvimento das doenças. A persistência de ação é de 14 a 21 dias.	35
CEVADA	Ferrugem castanha, helmintosporiose, oídio e rinosporiose				
OLIVEIRA	Olho de Pavão ( <i>Spilocaea oleagina</i> )	60	0,6	Realizar 1 tratamento em pré-floração, no início da Primavera, ao aparecimento da doença e em condições meteorológicas favoráveis. Se necessário, prosseguir os tratamentos no Outono com produtos aprovados para a finalidade. Não tratar após o início da abertura dos gemos florais. Realizar no máximo 1 tratamento por ano com este produto.	-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Aconselha-se a aplicação preventiva do produto e a alternância com fungicidas de diferente modo de ação
- Em Vinha as aplicações realizadas a partir do bago de chumbo deverão dirigir-se especialmente aos cachos para uma melhor proteção
- No caso dos cereais, no conjunto das doenças, realizar no máximo 1 aplicação por campanha com este ou outro fungicida que contenha DMI
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura



Videira / oídio



Oliveira / olho-de-pavão



Cereais / ferrugem

