

Fungicida

Fox[®] Plus

Fungicida sistêmico de amplo espectro

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Grânulos dispersíveis em água (WG) c/ 25% (p/p) de tebuconazol

Família química: Triazol

Número de AV: 1058

Classificação ADR: 3077, 9, III

Embalagem: 400 g



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- FOX[®] PLUS é um fungicida sistêmico da família dos triazóis pertencente ao grupo dos DMI (inibidor da demetilção na biossíntese de esteróis). Está indicado para o controle do pedrado e oídio da macieira; pedrado, oídio e estenfiliose da pereira; moniliose e oídio das prunóideas; cladosporiose, oídio e botritis em tomateiro (estufa); cladosporiose e oídio em tomate (ar livre); oídio e cladosporiose em pimenteiro (estufa); botritis, cladosporiose e esclerotinia em pepino (estufa) e oídio em vinha.
- Apresenta atividade preventiva de 7-8 dias, tendo uma capacidade curativa de cerca de 3 dias.
Após a aplicação:
 - o produto penetra rapidamente no interior da folha (2 horas), proporcionando resistência à lavagem;
 - a que se segue uma migração lenta e regular no interior da planta - proteção dos novos tecidos.

OBSERVAÇÕES:

Pela sua formulação, o FOX[®] PLUS apresenta:

- Ausência de pó
- Maior segurança para o aplicador
- Elevada homogeneidade das partículas
- Fácil de medir e de limpar
- Molha-se e mistura-se rapidamente
- Excelente dispersão e suspensão em água
- Não é necessário realizar uma pré-calda
- Estabilidade em armazém

ASCENZA[®]

CULTURA	DOENÇA	DOSE (kg/ha)	ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (dias)	Nº MÁXIMO DE APLICAÇÕES
PESSEGUEIRO, NECTARINA, DAMASQUEIRO, CEREJEIRA, GINJEIRA, ABRUNHEIRO, AMEIXEIRA	Moniliose, Oídio	0,5	Iniciar os tratamentos na primavera ou início do verão.	7	2
MACIEIRA	Pedrado e Oídio	0,6	Iniciar os tratamentos na primavera ou início do verão.	21	2
PEREIRA	Pedrado e Estenfiliose	0,6	Iniciar os tratamentos na primavera ou início do verão.	21	2
PEPINO (ESTUFA)	Podridão cinzenta, cladosporiose, esclerotinia	0,5		3	3
PIMENTEIRO (ESTUFA)	Cladosporiose, oídio	0,6		3	3
TOMATEIRO (AR LIVRE)	Podridão cinzenta, cladosporiose, oídio	1,3	Tratamentos na primavera ou início do verão.	3	3
TOMATEIRO (ESTUFA)	Podridão cinzenta, cladosporiose, oídio	0,25 a 1,5 (planta máx +1m)	Tratamentos na primavera ou início do verão.	3	2
		0,5 a 1 (planta com +1m)	Tratamentos na primavera ou início do verão.	3	3
		0,25 a 1,5 (cultura sem solo)	Tratamentos na primavera ou início do verão.	3	3
VIDEIRA	Oídio	0,5 kg/ha	Iniciar os tratamentos na primavera ou início do verão.	7	3

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Seguir as recomendações dos Serviços de Avisos.
- Não se deve aplicar FOX® PLUS onde se comecem a verificar quebras de eficácia após aplicações repetidas de IBE's.
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais do PI e as normas definidas para a cultura.