

Fungicida

Equador[®]

Fungicida sistêmico de amplo espectro

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Grânulos dispersíveis em água (WG) com 50% (p/p) de ciprodinil

Família química: Anilino pirimidinas

Número de APV: 1063

Classificação ADR: UN3077; 9; III

Embalagem: 500 g



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Eficaz a baixas temperaturas
- Excelente solução para os estados fenológicos iniciais das pomóideas
- Elevada resistência à lavagem após 2 horas de secagem da pulverização
- Ideal para estratégias anti-resistência pedrado, alternando com produtos de outras famílias
- Completa proteção da planta através de distribuição translaminar e sistemica acrópeta no xilema

ASCENZA[®]

CULTURA	DOENÇA	CONC. (g/hL)	DOSE (kg/ha)	ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (dias)
MACIEIRA E PEREIRA	Pedrado (<i>Venturia inaequalis</i> ; <i>Venturia pyrina</i>)	50	máximo 0,5	Iniciar as aplicações de acordo com as indicações do Serviço de Avisos. Na sua ausência fazer a 1ª aplicação ao aparecimento da ponta verde, repetir no estado de botão branco ou rosa e prosseguir até ao final da floração. A persistência biológica é de 7 a 10 dias. Não efectuar mais do que 3 tratamentos por campanha com este produto ou outro do grupo das anilino-pirimidinas.	60
VIDEIRA	Podridão cinzenta dos cachos (<i>Botrytis cinerea</i>)	75	máximo 0,75	As épocas fundamentais de tratamento são a floração-alimpa e o pintor. Em anos e/ou condições muito favoráveis poderão efectuar-se aplicações fungicidas ao fecho dos cachos e 3-4 semanas antes da colheita. Não efectuar mais do que 1 tratamento por campanha com este produto ou outro do grupo das anilino-pirimidinas	7 uvas de mesa 14 uvas para vinificação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem
- Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície
- Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas
- Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva
- Não entrar nas culturas tratadas até à secagem completa do pulverizado
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura



Macieira / pedrado



Pereira / pedrado



Videira / podridão cinzenta