

Herbicida

Campus Top 125 EC

Herbicida sistêmico

Tipo de produto: Herbicida

Composição: Concentrado para emulsão (EC) c/ 13,8% (p/p) ou 125 g/L de fluazifope-p-butilo

Família química: Difeniléter

Número de AV: 1484

Classificação ADR: 3082, 9, III

Embalagem: 1 L e 5 L



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- CAMPUS TOP 125 EC é um herbicida sistêmico para o controle de infestantes gramíneas, anuais e vivazes
- Absorvido rapidamente pelas folhas, desloca-se no interior das plantas até às zonas de crescimento ativo – tecidos meristemáticos
- Aplicado em pós-emergência da cultura e das infestantes

OBSERVAÇÕES

- No caso de ocorrer precipitação ou rega 1 hora após a aplicação, não é necessário repetir o tratamento pois a maior parte do produto aplicado já se encontra no interior da planta após este período de tempo

ASCENZA®

CULTURA	DOSE (L/ha)	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (Dias)
BATATEIRA	1,25	Aplicar o produto em culturas já instaladas (desde as primeiras folhas abertas - BBCH 12 até depois do final da floração - BBCH 74), mas sempre em pós-emergência precoce das infestantes em crescimento ativo.	90
BERINGELA	1,25	Aplicar o produto em culturas já instaladas (desde as primeiras folhas abertas - BBCH 12 até depois do final da floração - BBCH 74), mas sempre em pós-emergência precoce das infestantes em crescimento ativo.	30
CENOURA, CEBOLA, ALHO, PEPINO, ESPARGOS, PASTINACA	1,25	Aplicar o produto em culturas já instaladas (desde as primeiras folhas abertas - BBCH 12 até depois do final da floração - BBCH 74), mas sempre em pós-emergência precoce das infestantes em crescimento ativo.	28
FELIÃO-VERDE, ERVILHEIRA (SEM VAGEM) FAVEIRA, LENTILHAS	1,25	Aplicar o produto em culturas já instaladas (desde as primeiras folhas abertas - BBCH 12 até depois do final da floração - BBCH 74), mas sempre em pós-emergência precoce das infestantes em crescimento ativo.	90
SOJA	1,25	Aplicar o produto em culturas já instaladas (desde as primeiras folhas abertas - BBCH 12 até depois do final da floração - BBCH 74), mas sempre em pós-emergência precoce das infestantes em crescimento ativo.	75
ALFACE, CHICÓRIA, ESCAROLA, ENDÍVIA	1,25	Aplicar o produto em culturas já instaladas (desde as primeiras folhas abertas - BBCH 12 até depois do final da floração - BBCH 74), mas sempre em pós-emergência precoce das infestantes em crescimento ativo.	42
GIRASSOL, COLZA	1,25	Aplicar o produto em culturas já instaladas (desde as primeiras folhas abertas - BBCH 12 até depois do final da floração - BBCH 74), mas sempre em pós-emergência precoce das infestantes em crescimento ativo.	90
TABACO	1,25	Aplicar o produto em culturas já instaladas (desde as primeiras folhas abertas - BBCH 12 até antes do alongamento vertical do caule principal - BBCH 41), mas sempre em pós-emergência precoce das infestantes em crescimento ativo.	Não aplicável
BETERRABA SACARINA	1,25	Aplicar o produto em culturas já instaladas (desde as primeiras folhas abertas - BBCH 12 até ao final do crescimento da roseta - BBCH 41), mas sempre em pós-emergência precoce das infestantes em crescimento ativo.	56
ALGODOEIRO (SÓ PARA USO TÊXTIL)	1,25	Aplicar o produto em culturas já instaladas (desde as primeiras folhas abertas - BBCH 12 até depois do final da floração - BBCH 74), mas sempre em pós-emergência precoce das infestantes em crescimento ativo.	Não aplicável
ORNAMENTAIS: ROSEIRA, CRAVEIRO, ESTRELÍCIAS, LÍRIOS, GERBERAS, PELARGÓNIOS, VIOLAS, PETÚNIAS, CRISÂNTEMOS, ORELHA DE RATO, TÚLIPAS, AMARÍLIS, NARCISOS, BEGÓNIAS, DÁLIAS, FRÉSIAS, GLADIÓLOS, JARROS, ÍRIS, AGAPANTOS, GIPSOFILAS, GLOXÍNIAS, RANÚNCULOS, TREVO-BRANCO	1,25	Aplicar o produto em culturas já instaladas (desde as primeiras folhas abertas - BBCH 12 até à colheita dos órgãos vegetais a comercializar - BBCH 99), mas sempre em pós-emergência precoce das infestantes em crescimento ativo.	Não
MORANGUEIRO (INFESTANTES GRAMÍNEAS ANUAIS)	2,0	Aplicar o produto com a cultura já instalada e quando as infestantes estiverem em crescimento ativo (da fase das 3 a 4 folhas até ao dilhamento das infestantes).	42
MORANGUEIRO (INFESTANTES GRAMÍNEAS VIVAZES)	3,0	No combate das infestantes gramíneas vivazes, aplicar o produto na fase em que estas apresentem 4 folhas ou o seu caule aéreo tenha uma altura de aproximadamente 15 cm.	42
BETERRABA FORRAGEIRA (INFESTANTES GRAMÍNEAS ANUAIS)	2,0	Aplicar o produto com a cultura já instalada e quando as infestantes estiverem em crescimento ativo (1 a 3 folhas).	56
BETERRABA FORRAGEIRA (INFESTANTES GRAMÍNEAS VIVAZES)	3,0	Aplicar o produto com a cultura já instalada e quando as infestantes estiverem em crescimento ativo (10 a 50 cm de altura). Sorgo-de-Alepo não poderá ter mais do que 25 cm de altura.	56

CULTURA	DOSE (L/ha)	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (Dias)
ANANÁS (INFESTANTES GRAMÍNEAS ANUAIS)	2,0	No combate das infestantes gramíneas anuais, aplicar o produto com a cultura já instalada e quando as infestantes estiverem em crescimento ativo (da fase das 3 a 4 folhas até ao afilhamento das infestantes).	49
ANANÁS (INFESTANTES GRAMÍNEAS VIVAZES)	3,0	No combate das infestantes gramíneas vivazes, aplicar o produto na fase em que estas apresentem 4 folhas ou o seu caule aéreo tenha uma altura de aproximadamente 15 cm.	49
VIDEIRA, MACIEIRA, PEREIRA, PESSEGUIRO DAMASQUEIRO, AMEIXEIRA, CEREJEIRA LARANJEIRA, LARANJEIRA-AZEDA, LIMOEIRO LIMA, TANGERINEIRA, CLEMENTINA, MANDARINA (INFESTANTES GRAMÍNEAS ANUAIS)	2,0	No combate das infestantes gramíneas anuais, aplicar o produto com a cultura já instalada e quando as infestantes estiverem em crescimento ativo (da fase das 3 a 4 folhas até ao afilhamento das infestantes).	28
VIDEIRA, MACIEIRA, PEREIRA, PESSEGUIRO DAMASQUEIRO, AMEIXEIRA, CEREJEIRA LARANJEIRA, LARANJEIRA-AZEDA, LIMOEIRO LIMA, TANGERINEIRA, CLEMENTINA, MANDARINA (INFESTANTES GRAMÍNEAS VIVAZES)	3,0	No combate das infestantes gramíneas vivazes, aplicar o produto na fase em que estas apresentem 4 folhas ou o seu caule aéreo tenha uma altura de aproximadamente 15 cm.	28
BANANEIRA (INFESTANTES GRAMÍNEAS ANUAIS)	2,0	No combate das infestantes gramíneas anuais, aplicar o produto com a cultura já instalada e quando as infestantes estiverem em crescimento ativo (da fase das 3 a 4 folhas até ao afilhamento das infestantes).	7
BANANEIRA (INFESTANTES GRAMÍNEAS VIVAZES)	3,0	No combate das infestantes gramíneas vivazes, aplicar o produto na fase em que estas apresentem 4 folhas ou o seu caule aéreo tenha uma altura de aproximadamente 15 cm.	7
TOMATEIRO (INFESTANTES GRAMÍNEAS ANUAIS)	2,0	Aplicar o produto com a cultura já instalada e até à fase da pré-floração, antes do gomo floral estar visível (BBCH 51) e quando as infestantes estiverem em crescimento ativo (da fase das 3 a 4 folhas até ao afilhamento das infestantes).	70
ERVILHEIRA (COM VAGEM) (INFESTANTES GRAMÍNEAS ANUAIS)	2,0	Aplicar o produto com a cultura já instalada e quando as infestantes estiverem em crescimento ativo (da fase das 3 a 4 folhas até ao afilhamento das infestantes).	28

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Erva-febra (*Lolium rigidum*), Balanco (*Avena sterilis*), Alpista-brava (*Phalaris brachystachys*), Rabo-de-raposa (*Alopecurus myosuroides*) e Rebrotamento de cereais semeados anteriormente.

INFESTANTES RESISTENTES

Dicotiledóneas em geral (infestantes de folha larga) e Cabelo-de-cão (*Poa annua*).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na altura da aplicação o solo deve ter humidade, para uma melhor eficácia do produto
- Quando há temperaturas baixas, a ação do produto é mais lenta mas a eficácia é a mesma
- Não atfingir as culturas vizinhas da área a tratar
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura