

# Inseticida

# Boreal<sup>®</sup> Plus

Inseticida/Acaricida

Tipo de produto: Inseticida

Composição: Concentrado para emulsão (EC) c/ 1,8% (p/p) ou 18 g/L de abamectina

Família química: Avermectina

Número de APV: 1412

Classificação ADR: 3082, 9, III

Embalagem: 1L, 5L e 20 L



PERIGO

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **BOREAL<sup>®</sup> PLUS** é um inseticida/acaricida de largo espectro de ação e elevada eficácia.
- A abamectina é rapidamente absorvida pelas folhas e tem ação translaminar.
- **BOREAL<sup>®</sup> PLUS** resiste, por isso, à lavagem pela chuva.
- Após a ingestão da abamectina, os insetos ficam paralisados e param de se alimentar, acabando por morrer. Desta forma, embora sejam necessários 3-4 dias para se alcançar a máxima mortalidade da praga, esta já não está a provocar danos.

## OBSERVAÇÕES

- Para se maximizar a eficácia e persistência dos tratamentos de **BOREAL<sup>®</sup> PLUS**, é importante promover a sua penetração no interior dos órgãos vegetais.
- O **BOREAL<sup>®</sup> PLUS** é um larvicida, pelo que, de um modo geral, deve ser aplicado logo que se detetem as formas móveis (larvas) dos insetos.

CULTURA (Apenas em cultura protegida-estufa)	DOENÇA	ÉPOCA DE APLICAÇÃO	CONCENTRAÇÃO /DOSE	Nº DE TRATAMENTOS/ANO					
TOMATEIRO (estufa)	Aranhico-amarelo ( <i>Tetranychus urticae</i> ),	Ao aparecimento das primeiras formas móveis.	50-100 mL/hL (0,15-1 L/ha)	Efetuar um máximo de 3 tratamentos, com um intervalo mínimo de 7 dias					
	Ácaro branco ( <i>Polyphagotarsonemus latus</i> ), Ácaro-do-bronzamento-do-tomateiro ( <i>Aculus lycopersica</i> )	Ao aparecimento da praga e ou sintomas.							
	Larva-mineira ( <i>Liriomyza</i> sp)	Ao aparecimento das primeiras posturas							
MELOEIRO MELANCIA ABÓBORA (estufa)	Aranhico-amarelo ( <i>Tetranychus urticae</i> )	Ao aparecimento das primeiras formas móveis.		50-100 mL/hL (0,15-1 L/ha)	Efetuar um máximo de 2 tratamentos, com um intervalo mínimo de 7 dias				
	Larva-mineira ( <i>Liriomyza</i> sp)	Ao aparecimento das primeiras posturas.							
PEPINO PEPINO PARA CONSERVA COURGETTE (estufa)	Aranhico-amarelo ( <i>Tetranychus urticae</i> )	Ao aparecimento das primeiras formas móveis.				50-100 mL/hL (0,15-1 L/ha)	Efetuar um máximo de 2 tratamentos, com um intervalo mínimo de 7 dias		
	Larva-mineira ( <i>Liriomyza</i> sp)	Ao aparecimento das primeiras posturas.							
MORANGUEIRO (estufa)	Aranhico-amarelo ( <i>Tetranychus urticae</i> ), Ácaro-do-morangueiro ( <i>Phytoneumus pallidus</i> )	Ao aparecimento das primeiras formas móveis.						50-100 mL/hL (0,15-1 L/ha)	Efetuar um máximo de 2 tratamentos, com um intervalo mínimo de 7 dias
	Larva-mineira ( <i>Liriomyza</i> sp).	Ao aparecimento das primeiras posturas.							
BERINGELA (estufa)	Aranhico-amarelo ( <i>Tetranychus urticae</i> )	Ao aparecimento das primeiras formas móveis.	50-80 mL/hL (0,15-0,8 L/ha)		Efetuar um máximo de 3 tratamentos, com um intervalo mínimo de 7 dias				

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.